

Срна



Систематика

Царство	<i>Animalia</i>	Животиње
Тип	<i>Chordata</i>	Хордати
Подтип	<i>Vertebrata</i>	Кичмењаци
Класа	<i>Mammalia</i>	Сисари
Ред	<i>Artiodactyla</i>	Папкари
Породица	<i>Cervidae</i>	–
Род	<i>Capreolus</i>	–

Биномијална номенклатура

Capreolus capreolus □ (Карл Лине, 1758)

Ареал врсте



Срна (*Capreolus capreolus*) је врста сисара из породице (*Cervidae*).

Особине

Има смеђе крзно које је љети црвенкасте боје, а зими тамније, кратки длакави бијели реп и витке, високе ноге. Има округласту главу, а на горњим очним капцима има дуге трепавице. Мужјак: кратка глава. тупа губица, на чеоној кости мали рогови, уши велике и овалне, јако помичне са унутрашње стране. Мужјак има кратко и шиљато рокове док га женка уопште нема. Млади на леђима имају бијеле пјеге.

Нарасте у висину око 70-75cm, дужине 120-140cm, тежине до 35kg.

Начин живота

Живи у мањим крдима, у шумама са ниским раслињем, активна је дању и ноћу, а храни се најчешће у сумрак. Биљојед је, а зими се храни сухим лишћем, кором дрвећа и жиревима.

Срна се креће ходом, касом и скоком а одличан је пливач.. Плашљива је и живи у стадима која предводе стари мужјаци. .

Рогови срне се сваке године потпуно обнављају – стари рогови отпадају а расту нови. Рогови се гранају и код сваког новог роговља повећава се број огранака.

Размножаване

Јединке се паре у другој половини јула и првој половини августа, а понекад и касније. Код срна које се паре касније не долази до прекида развоја заметка тј. пород се одвија истовремено са онима које су биле у ембриотенцији. Срна даћ прати срну која је у терању и то траје 4 дана, а потом је напушта и тражи другу. На тај начин, он оплоди 4-5 срна.

Женка се окоти након 10 мјесеци. Првороткиње доносе на свет једно, а касније најчешће два ланета. Младо лане сише мајку око 3 мјесеца, а самостално постаје након годину дана.

Референце

1. 1.^ Интернет сајт агенције Европске уније за заштиту животне средине ([The European Environment Agency](#))
2. 2.^ Данијел Поповић, *Ловачки лексикон*, стр. 144

