

## Шумска волухарица

петак, 24 јун 2011 13:17 - Последње ажурирано среда, 29 јун 2011 10:44

### Шумска волухарица



#### Систематика

Царство

*Animalia*

Животиње

Тип

*Chordata*

Хордати

Подтип

*Vertebrata*

Кичмењаци

Класа

*Mammalia*

Сисари

Ред

*Rodentia*

Глодари

Породица

*Cricetidae*

Хрчкови

Род


*Myodes*

–

#### Биномијална номенклатура

*Clethrionomys glareolus* (Schreber, 1780)

#### Ареал врсте



**Шумска волухарица** (*Clethrionomys glareolus*) је врста глодара из породице Хрчкова (*Cricetidae*).

## Особине

Крзно пољске волухарице је глатко и кратко, црвенкасто-смеђе боје, док је боја на стомаку сива. Боја се укала са бојом лишћа или кора дрвећа. Нарасте до 12 цм, реп је краћи од 4,5 цм, а уши су кратке и длакаве. Досеже тежину од 35-45 грама. Животни вјек је до 18 мјесеци. Живи у скупинама, а оглашава се продорним цичањем.

## Исхрана

Шумска волухарица је врста животиње која је активна цјеле године. Под земљом копа ходнике с гнијездом и спремиштем хране. Храни се житарицама, зељастим биљкама, сјеменкама и инсектима, зими једе и кору дрвећа, мртво лишће, маховину, корјење....

## Размножавање

Гнездо шумских волухарица смештено је најчешће 2-10 см у дубину на сувом земљишту и сакривено је густом зељастом вегетацијом. Женка носи младе 16-18 дана, и може да има 2-4 легла годишње (у периоду од марта до јула) и коти 3-5 младих. Волухарица репродуктивну зрелост постиже након два и по мјесеца. Младунци рођени у јесен обично не преживе зиму.

### Распрострањеност

Распрострањена је у средњој и источној Европи, а живи у шумама, грмовима и рјечним екосистемима.

## Видјети још

- [П ољска волухарица \(\*Microtus arvalis\*\)](#)
- [Водена волухарица \(\*Arvicola terrestris\*\)](#)

## Референце

1. 1.^ Интернет сајт агенције Европске уније за заштиту животне средине ( [The European Environment Agency](#) )