

Двобојна ровка



Систематика

Царство	<i>Animalia</i>	Животиње
Тип	<i>Chordata</i>	Хордати
Подтип	<i>Vertebrata</i>	Кичмењаци
Класа	<i>Mammalia</i>	Сисари
Ред	<i>Soricomorpha</i>	Ровчице
Породица	<i>Soricidae</i>	–
Род	<i>Crocidura</i>	–

Биномијална номенклатура

Crocidura leucodon □ (Hermann, 1780)

Ареал врсте



Двобојна ровка (*Crocidura leucodon*) је врста глодара из породице (*Soricidae*).

Особине

Дужина тела од 60-87 mm, дужина репа до 40 mm, тежина од 7 до 15 грама. Драка је кратка и густа, њушка је издужена. Боја двобојне ровке је смеђа или тамно смеђа док са унутрашње стране, на стомаку, боја је свјетлија, углавном свјетло сива или бијела. Храни се углавном инсектима, црвима и другим бескичмењацима. Углавном је активна ноћу. Њена највећа опасност је сова. Животни вјек им је до 1.5 година.

Размножавање

Сезона парења траје од марта до октобра. Након периода од 31 дана, женка излеже од 2-6 младих. После 4 месеца постају полно зрели а самим тим могу да се размножавају у истој години. Током године ровка може да има 2-4 легла

Распрострањеност

Живе на ливадама, пољима, ивицима шума, жбуновитим областима. Распрострањена је у Европи, од Француске до Каспијског мора. У Азији је присуство ограничено на Кавказ.

Азијска присуство је ограничено на Кавказ.

Видјети још

- [Ровчица \(Crocidura suaveolens\)](#)

Референце

1. 1.^ Интернет сајт агенције Европске уније за заштиту животне средине ([The European Environment Agency](#))